



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



SEPTEMBRE 2020

Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018

FOIE

Etude collaborative partenariale entre le réseau français des registres des cancers (Francim), le service de Biostatistique-Bioinformatique des Hospices civils de Lyon (HCL), Santé publique France et l'Institut national du cancer (INCa)

Compléments



Compléments à la partie 1 - Survie à 1 et 5 ans des personnes diagnostiquées entre 2010 et 2015 (tous registres)

Table C1. Survie observée (%) à 1 et 5 ans selon l'âge et le sexe et IC à 95%

	1 an			5 ans		
	Homme	Femme	Ensemble	Homme	Femme	Ensemble
50 ans	54 [52;56]	62 [57;65]	56 [54;58]	24 [22;27]	31 [27;35]	26 [24;28]
60 ans	53 [51;54]	55 [52;58]	53 [51;54]	20 [19;22]	24 [21;27]	21 [20;22]
70 ans	50 [49;52]	47 [45;50]	50 [49;51]	15 [14;17]	16 [13;18]	15 [14;17]
80 ans	39 [37;40]	35 [33;38]	38 [37;40]	8 [7;9]	7 [6;9]	8 [7;9]

Table C2. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans selon l'âge au diagnostic pour Hommes et Femmes ensemble et IC à 95%

Âge	0 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
50 ans	1,22 [1,07;1,40]	0,48 [0,43;0,53]	0,34 [0,31;0,38]	0,17 [0,15;0,19]	0,11 [0,09;0,14]
60 ans	1,38 [1,25;1,53]	0,51 [0,48;0,55]	0,38 [0,35;0,40]	0,20 [0,18;0,22]	0,16 [0,14;0,19]
70 ans	1,51 [1,39;1,65]	0,54 [0,51;0,58]	0,41 [0,38;0,43]	0,25 [0,23;0,27]	0,21 [0,19;0,24]
80 ans	1,99 [1,83;2,16]	0,74 [0,69;0,80]	0,52 [0,48;0,56]	0,31 [0,27;0,34]	0,25 [0,21;0,31]

Figure C1. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) (a) et survie nette (b) selon le temps depuis le diagnostic pour différents âges, chez l'homme et chez la femme





Figure C2. Survie nette à 1 et 5 ans selon l'âge au diagnostic avec IC à 95%, chez l'homme et chez la femme



Complément à la partie 2 - Tendances de la survie nette à 1, 5 et 10 ans des personnes diagnostiquées entre 1990 et 2015 (restriction aux registres couvrant l'ensemble de la période 1990-2015, Hommes et Femmes ensemble)

Table C3. Survies observée et nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Années	1 an		5 ans		10 ans	
	observée	nette	observée	nette	observée	nette
1990	26 [24;28]	27 [25;29]	5 [4;6]	6 [5;7]	2 [2;3]	3 [2;4]
1995	31 [30;32]	32 [31;33]	7 [6;8]	8 [7;9]	3 [3;3]	4 [3;5]
2000	37 [36;38]	38 [37;39]	10 [9;11]	11 [11;12]	5 [4;5]	6 [5;7]
2005	41 [40;42]	43 [41;44]	12 [11;12]	13 [13;14]	6 [5;6]	7 [6;8]
2010	45 [44;46]	46 [45;47]	14 [13;14]	15 [14;16]	7 [6;8]	8 [7;9]
2015	44 [43;46]	46 [44;47]	14 [13;16]	16 [14;17]	ND	ND

ND : Non Disponible

Table C4. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans et 10 ans selon l'âge et selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Année	0 mois	6 mois	1 an	5 ans	10 ans
50 ans					
1990	3,41 [2,78;4,18]	0,89 [0,73;1,07]	0,57 [0,46;0,71]	0,15 [0,10;0,23]	0,03 [0,01;0,09]
1995	2,20 [1,89;2,56]	0,79 [0,69;0,90]	0,49 [0,43;0,57]	0,12 [0,10;0,16]	0,03 [0,02;0,06]
2000	1,53 [1,31;1,78]	0,64 [0,57;0,72]	0,43 [0,38;0,49]	0,11 [0,09;0,13]	0,03 [0,02;0,05]
2005	1,24 [1,07;1,45]	0,54 [0,49;0,61]	0,38 [0,34;0,43]	0,10 [0,09;0,13]	0,04 [0,02;0,06]
2010	1,17 [0,99;1,38]	0,51 [0,45;0,58]	0,35 [0,31;0,40]	0,11 [0,09;0,14]	0,04 [0,02;0,09]
2015	1,18 [0,90;1,55]	0,48 [0,39;0,59]	0,36 [0,29;0,45]	0,11 [0,07;0,17]	ND
60 ans					
1990	4,06 [3,45;4,79]	0,90 [0,76;1,06]	0,65 [0,54;0,77]	0,22 [0,16;0,30]	0,07 [0,04;0,13]
1995	2,51 [2,20;2,86]	0,84 [0,74;0,94]	0,52 [0,46;0,59]	0,19 [0,16;0,23]	0,07 [0,04;0,10]
2000	1,74 [1,53;1,99]	0,70 [0,63;0,77]	0,44 [0,40;0,49]	0,16 [0,14;0,19]	0,06 [0,05;0,08]
2005	1,45 [1,27;1,65]	0,58 [0,53;0,64]	0,39 [0,36;0,43]	0,16 [0,14;0,18]	0,06 [0,04;0,08]
2010	1,39 [1,22;1,60]	0,52 [0,47;0,58]	0,38 [0,35;0,42]	0,17 [0,14;0,19]	0,06 [0,04;0,10]
2015	1,42 [1,15;1,75]	0,48 [0,40;0,57]	0,42 [0,36;0,50]	0,16 [0,11;0,23]	ND
70 ans					
1990	3,88 [3,35;4,49]	0,87 [0,75;1,01]	0,67 [0,57;0,78]	0,23 [0,17;0,30]	0,15 [0,08;0,28]
1995	2,71 [2,44;3,00]	0,84 [0,76;0,93]	0,58 [0,52;0,64]	0,24 [0,20;0,29]	0,13 [0,09;0,19]
2000	2,01 [1,82;2,22]	0,78 [0,72;0,85]	0,49 [0,45;0,54]	0,24 [0,21;0,27]	0,11 [0,08;0,15]
2005	1,63 [1,47;1,80]	0,68 [0,62;0,74]	0,43 [0,40;0,47]	0,22 [0,20;0,25]	0,10 [0,07;0,14]
2010	1,47 [1,32;1,64]	0,59 [0,54;0,64]	0,42 [0,38;0,46]	0,22 [0,19;0,25]	0,09 [0,05;0,15]
2015	1,48 [1,25;1,75]	0,56 [0,49;0,64]	0,46 [0,40;0,53]	0,21 [0,16;0,28]	ND
80 ans					
1990	5,04 [4,23;6,01]	1,11 [0,91;1,36]	0,69 [0,55;0,88]	0,21 [0,13;0,34]	0,31 [0,11;0,91]
1995	3,79 [3,34;4,30]	1,07 [0,94;1,22]	0,67 [0,58;0,78]	0,24 [0,17;0,32]	0,24 [0,12;0,50]
2000	2,83 [2,53;3,18]	0,99 [0,89;1,10]	0,65 [0,58;0,74]	0,25 [0,20;0,31]	0,19 [0,12;0,31]
2005	2,19 [1,96;2,45]	0,87 [0,79;0,96]	0,60 [0,54;0,66]	0,25 [0,21;0,30]	0,15 [0,09;0,26]
2010	1,94 [1,73;2,17]	0,78 [0,70;0,86]	0,54 [0,49;0,60]	0,25 [0,20;0,31]	0,13 [0,05;0,29]
2015	2,02 [1,70;2,40]	0,74 [0,64;0,86]	0,53 [0,45;0,62]	0,25 [0,17;0,38]	ND

ND : Non Disponible

Table C5. Survie nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et par âge au diagnostic et IC à 95%

Age	1990	1995	2000	2005	2010	2015
1 an						
50	31 [27;35]	38 [36;41]	46 [44;49]	52 [50;55]	55 [52;57]	56 [51;60]
60	28 [25;31]	35 [33;38]	43 [41;45]	49 [47;51]	52 [50;54]	53 [49;56]
70	28 [25;31]	34 [32;36]	40 [38;42]	45 [44;47]	49 [47;51]	50 [47;53]
80	20 [17;23]	25 [23;27]	30 [28;32]	35 [33;37]	39 [37;41]	40 [37;43]
5 ans						
50	8 [6;11]	14 [12;16]	21 [18;23]	24 [22;26]	25 [23;28]	26 [22;31]
60	6 [4;7]	10 [9;12]	16 [14;18]	19 [18;21]	20 [18;22]	21 [18;25]
70	5 [4;7]	7 [6;9]	10 [9;12]	14 [12;15]	16 [14;17]	17 [15;20]
80	4 [2;6]	5 [4;6]	6 [5;7]	8 [7;9]	9 [8;11]	11 [9;13]
10 ans						
50	6 [4;8]	10 [8;12]	15 [13;17]	18 [16;20]	18 [15;21]	ND
60	3 [2;4]	6 [5;7]	9 [8;11]	11 [10;13]	12 [10;13]	ND
70	2 [2;3]	3 [3;4]	5 [4;5]	6 [5;7]	7 [6;9]	ND
80	1 [1;3]	2 [1;3]	2 [2;3]	3 [2;4]	4 [3;5]	ND

ND : Non Disponible