



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



JUIN 2021

Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018

PARENCHYME RÉNAL

Etude collaborative partenariale entre le réseau français des registres des cancers (Francim), le service de Biostatistique-Bioinformatique des Hospices civils de Lyon (HCL), Santé publique France et l'Institut national du cancer (INCa)

Compléments



Compléments à la partie 1 - Survie à 1 et 5 ans des personnes diagnostiquées entre 2010 et 2015 (tous registres)

Table C1. Survie observée (%) à 1 et 5 ans selon l'âge et le sexe et IC à 95%

	1 an			5 ans		
	Homme	Femme	Ensemble	Homme	Femme	Ensemble
40 ans	94 [92;95]	96 [94;97]	95 [93;96]	86 [84;88]	90 [88;92]	88 [86;89]
50 ans	92 [90;92]	94 [93;95]	92 [92;93]	81 [79;82]	87 [85;88]	82 [81;83]
60 ans	89 [88;90]	92 [91;93]	89 [89;90]	74 [72;75]	81 [79;83]	76 [75;77]
70 ans	86 [84;87]	87 [86;89]	86 [85;87]	67 [65;68]	72 [70;74]	68 [67;70]
80 ans	75 [73;76]	77 [75;79]	76 [75;77]	47 [44;49]	51 [49;53]	49 [47;50]

Table C2. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans selon l'âge au diagnostic pour Hommes et Femmes ensemble et IC à 95%

Âge	0 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
40 ans	0,07 [0,04;0,11]	0,05 [0,04;0,07]	0,04 [0,03;0,05]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,02]
50 ans	0,11 [0,08;0,14]	0,07 [0,06;0,08]	0,05 [0,04;0,06]	0,02 [0,02;0,02]	0,01 [0,01;0,02]
60 ans	0,17 [0,14;0,21]	0,10 [0,08;0,11]	0,06 [0,06;0,07]	0,03 [0,02;0,03]	0,02 [0,01;0,02]
70 ans	0,30 [0,26;0,35]	0,11 [0,10;0,12]	0,07 [0,06;0,08]	0,04 [0,03;0,04]	0,02 [0,02;0,03]
80 ans	0,67 [0,59;0,77]	0,17 [0,16;0,19]	0,09 [0,08;0,10]	0,05 [0,04;0,06]	0,04 [0,03;0,06]

Figure C1. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) (a) et survie nette (b) selon le temps depuis le diagnostic pour différents âges, chez l'homme et chez la femme





Figure C2. Survie nette à 1 et 5 ans selon l'âge au diagnostic avec IC à 95%, chez l'homme et chez la femme



Complément à la partie 2 - Tendances de la survie nette à 1, 5 et 10 ans des personnes diagnostiquées entre 1990 et 2015 (restriction aux registres couvrant l'ensemble de la période 1990-2015, Hommes et Femmes ensemble)

Table C3. Survies observée et nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Années	1 an		5 ans		10 ans	
	observée	nette	observée	nette	observée	nette
1990	76 [74;77]	77 [76;79]	52 [50;54]	59 [56;61]	38 [36;40]	50 [47;53]
1995	78 [77;79]	80 [79;81]	56 [54;57]	63 [62;65]	42 [40;43]	55 [53;57]
2000	80 [79;81]	82 [81;83]	59 [58;60]	67 [66;68]	45 [43;46]	59 [58;61]
2005	83 [82;83]	84 [84;85]	63 [62;64]	71 [70;72]	49 [48;50]	64 [63;66]
2010	84 [83;84]	85 [85;86]	65 [64;66]	73 [72;74]	52 [51;53]	67 [65;68]
2015	84 [83;85]	86 [84;87]	66 [64;68]	73 [71;75]	ND	ND

ND : Non Disponible

Table C4. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans et 10 ans selon l'âge et selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Année	0 mois	6 mois	1 an	5 ans	10 ans
40 ans					
1990	0,13 [0,09;0,20]	0,12 [0,10;0,16]	0,11 [0,09;0,14]	0,03 [0,02;0,04]	0,01 [0,01;0,02]
1995	0,10 [0,07;0,15]	0,10 [0,08;0,12]	0,09 [0,07;0,11]	0,02 [0,02;0,03]	0,01 [0,01;0,02]
2000	0,08 [0,05;0,12]	0,08 [0,06;0,09]	0,07 [0,06;0,09]	0,02 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,01]
2005	0,06 [0,04;0,09]	0,06 [0,05;0,07]	0,06 [0,04;0,07]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,00;0,01]
2010	0,05 [0,04;0,08]	0,05 [0,04;0,06]	0,05 [0,04;0,06]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,00;0,01]
2015	0,05 [0,03;0,08]	0,05 [0,04;0,06]	0,04 [0,03;0,06]	0,01 [0,01;0,02]	ND
60 ans					
1990	0,35 [0,30;0,43]	0,20 [0,18;0,23]	0,13 [0,11;0,15]	0,04 [0,03;0,05]	0,02 [0,02;0,03]
1995	0,29 [0,24;0,34]	0,16 [0,15;0,18]	0,10 [0,09;0,12]	0,03 [0,03;0,04]	0,02 [0,02;0,03]
2000	0,23 [0,20;0,27]	0,13 [0,12;0,15]	0,08 [0,08;0,09]	0,03 [0,02;0,03]	0,02 [0,01;0,02]
2005	0,19 [0,16;0,22]	0,11 [0,10;0,12]	0,07 [0,06;0,08]	0,02 [0,02;0,02]	0,01 [0,01;0,02]
2010	0,16 [0,14;0,20]	0,09 [0,08;0,10]	0,06 [0,05;0,07]	0,02 [0,02;0,02]	0,01 [0,01;0,02]
2015	0,16 [0,13;0,19]	0,09 [0,08;0,10]	0,06 [0,05;0,07]	0,02 [0,02;0,02]	ND
80 ans					
1990	1,34 [1,14;1,56]	0,29 [0,26;0,34]	0,18 [0,15;0,21]	0,06 [0,05;0,08]	0,04 [0,02;0,08]
1995	1,15 [1,01;1,32]	0,25 [0,23;0,28]	0,15 [0,13;0,18]	0,05 [0,04;0,06]	0,04 [0,02;0,07]
2000	0,99 [0,87;1,12]	0,22 [0,20;0,24]	0,13 [0,11;0,15]	0,04 [0,04;0,06]	0,03 [0,02;0,06]
2005	0,85 [0,75;0,96]	0,19 [0,17;0,21]	0,11 [0,10;0,13]	0,04 [0,03;0,05]	0,03 [0,02;0,06]
2010	0,79 [0,69;0,89]	0,17 [0,16;0,19]	0,11 [0,09;0,12]	0,04 [0,03;0,05]	0,03 [0,01;0,05]
2015	0,81 [0,70;0,94]	0,18 [0,16;0,20]	0,11 [0,09;0,13]	0,04 [0,03;0,05]	ND

ND : Non Disponible

Table C5. Survie nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et par âge au diagnostic et IC à 95%

Age	1990	1995	2000	2005	2010	2015
1 an						
40	89 [86;91]	91 [89;92]	93 [91;94]	94 [93;95]	95 [94;96]	95 [94;96]
50	85 [83;87]	88 [86;89]	90 [89;91]	92 [91;93]	93 [92;94]	93 [92;94]
60	81 [79;83]	84 [83;85]	87 [86;88]	89 [88;90]	91 [90;91]	91 [90;92]
70	76 [74;78]	80 [79;81]	83 [82;84]	86 [85;87]	87 [86;88]	87 [86;89]
80	66 [62;69]	70 [67;72]	73 [72;75]	77 [75;78]	78 [77;80]	78 [75;80]
5 ans						
40	72 [67;75]	77 [74;79]	81 [79;83]	85 [83;86]	87 [85;89]	88 [85;90]
50	68 [65;70]	73 [71;75]	78 [76;79]	82 [81;83]	84 [83;85]	85 [83;87]
60	63 [60;65]	68 [67;70]	74 [72;75]	78 [77;79]	80 [79;82]	81 [79;83]
70	57 [54;60]	62 [60;64]	68 [66;69]	72 [71;74]	75 [73;76]	75 [72;77]
80	45 [41;49]	50 [47;53]	55 [53;58]	60 [58;62]	62 [60;64]	61 [58;65]
10 ans						
40	65 [60;69]	71 [68;74]	76 [74;79]	81 [79;83]	83 [81;85]	ND
50	60 [56;63]	66 [64;68]	72 [70;73]	77 [75;78]	79 [78;81]	ND
60	54 [50;57]	60 [58;62]	66 [64;68]	71 [70;73]	74 [73;76]	ND
70	47 [44;51]	53 [51;56]	59 [57;61]	65 [63;66]	68 [65;70]	ND
80	36 [32;41]	41 [38;45]	47 [44;50]	52 [49;55]	54 [51;57]	ND

ND : Non Disponible